


ABSTRAK

Kanker ovarium merupakan kanker ketujuh yang paling umum terjadi pada wanita di seluruh dunia dengan 239.000 kasus pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada pasien kanker ovarium di Rumah Sakit Bethesda dan Panti Rapih Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan kuisioner EORTC QLQ-30 yang berisi 30 pertanyaan yang terdiri dari 3 skala yaitu skala fungsional, gejala dan global. Responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh pasien kanker ovarium yang sedang menjalankan kemoterapi selama 1 Maret - 10 Mei 2019 di Rumah Sakit Bethesda dan Panti Rapih Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran kualitas hidup pada pasien kanker ovarium di Rumah Sakit Bethesda dan Panti Rapih Yogyakarta dapat digambarkan bahwa kualitas hidup pada pasien kanker ovarium memiliki interpretasi kualitas hidup baik dan sedang. Nilai Kualitas hidup secara keseluruhan tertinggi dimiliki oleh pasien pada nomor pasien tujuh yang berada pada siklus kemoterapi II dan terendah dimiliki oleh pasien dengan nomor pasien delapan yang berada pada siklus IV.

Kata kunci : kanker ovarium, siklus kemoterapi, kualitas hidup.



ABSTRACT

Ovarian cancer is the seventh most common cancer in women around the world with 239,000 cases in 2012. This study was conducted to determine the quality of life in ovarian cancer patients at Bethesda Hospital and Panti Rapih in Yogyakarta. This research is a descriptive study using the EORTC QLQ-30 questionnaire which contains 30 questions consisting of 3 scales, namely functional, symptomatic and global scale. Respondents used in this study were all ovarian cancer patients who were undergoing chemotherapy during March 1 to May 10 2019 at Bethesda Hospital and Rapih Orphanage in Yogyakarta. Based on the results of research on the description of the quality of life in ovarian cancer patients at Bethesda Hospital and Rapih Panti Yogyakarta it can be illustrated that the quality of life in ovarian cancer patients has a good and moderate interpretation of quality of life. The highest overall quality of life value is owned by patients in patient number seven who are in the chemotherapy cycle II and the lowest is owned by patients with patient number eight who are in cycle IV.

Keywords: *ovarian cancer, chemotherapy cycle, quality of life.*

