

Seminar Nasional **SAINS DAN TEKNOLOGI**

SERI 2

“ Peran Sains dan Teknologi dalam Keseimbangan Kehidupan
dan Lingkungan yang Berkelanjutan ”

PROSIDING

**Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka**

2024



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Seminar Nasional SAINS DAN TEKNOLOGI

SERI 2

“ Peran Sains dan Teknologi dalam Keseimbangan Kehidupan
dan Lingkungan yang Berkelanjutan ”

Narasumber



Prof. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si.
Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir
dan Lautan-IPB



Dr. Welli Yuliatmoko, S.TP., M.Si.
Dosen Prodi Teknologi Pangan FST-UT

Sambutan



Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi-UT

SEMINAR NASIONAL

Sabtu
29 Juni 2024
09.00 WIB - selesai
Zoom dan Youtube

Tanggal Penting

- ◆ Batas Pengumpulan Abstrak:
15 Juni 2024
- ◆ Batas Pengumpulan Full Paper:
28 Juni 2024

SUB TEMA

Matematika

Biologi

Perencanaan Wilayah dan Kota

Statistika

Teknologi Pangan

Manajemen Perikanan

Sistem Informasi

Agribisnis

Studi Lingkungan

SCAN ME



Pendaftaran Peserta atau Pemakalah
https://sl.ut.ac.id/Semnas_SainTek_Seri2



Fitria Amastini 0813-1844-4062

✓ GRATIS Pendaftaran

✓ GRATIS e-Sertifikat

✓ Artikel dapat dipublikasi di
Prosiding SainTek Ber-ISSN



fst@ecampus.ut.ac.id



<https://fst.ut.ac.id/>

About the Conference Proceedings Series

Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Saintek) Seri 1 merupakan kegiatan seminar akademik rutin setiap semester yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (FST UT). Seminar akademik ini terdiri dari sembilan subtema yaitu matematika, statistika, sistem informasi, biologi, agribisnis, teknologi pangan, perencanaan wilayah dan kota, manajemen perikanan, dan studi lingkungan. Sains dan Teknologi menjadi unsur peradaban yang sangat penting untuk mendayagunakan sumber daya yang tersedia dan memiliki peranan sentral dalam melahirkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seminar yang bertujuan untuk meningkatkan suasana akademik bagi mahasiswa dan dosen pada bidang sains dan teknologi memiliki attensi yang tinggi sebagai wadah untuk *sharing knowledge*, hasil penelitian, maupun diskusi interaktif. Seminar Nasional Saintek diharapkan meningkatkan capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Universitas serta akreditasi program studi yang ada di FST UT. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah bangsa dalam lingkup makro dan mikro melalui sumbangsih ide, gagasan dan pemikiran yang diperoleh dari hasil kajian yang valid.

ISSN : [3047-6569 \(Online\)](#)

ISSN : 3047-6569 (Online)

ISSN 3047-6569



Visitors

	4,914		5
	154		5
	12		4
	8		3
	6		3

 FLAG counter

...:: Sub Tema ::...

Matematika

Statistika

Sistem Informasi

Biologi

Agribisnis

Teknologi Pangan

Perencanaan Wilayah dan Kota

Manajemen Perikanan

Studi Lingkungan

Fakultas Sains dan Teknologi

Gedung Fakultas I

Universitas Terbuka

Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15437

Telp : (021) 7490941

e-Mail : fst@ecampus.ut.ac.id

Biologi

27 Items

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DETERGEN CAIR ANTINAJIS MUGHALLAZAH KOMBINASI BENTONIT, KAOLIN DAN INFUSA DAUN KERSEN (*Muntingia calabura L.*) TERHADAP *Escherichia coli* DAN *Staphylococcus aureus*

Dwi Endah Kusumawati, Dina Fatmawati, Rega Putri Puspitasari

851-858

ANALISA PENGARUH SUHU, PH DAN TDS TERHADAP KUALITAS AIR DI SUNGAI KAHAYAN KALIMANTAN TENGAH

Yuni Damayanti Nainggolan, Tina Sugiyani, Jesika Nababan, Wenika Simbolon, Dwi Hermayantiningsih 913-919

ANALISIS KANDUNGAN MIKROPLASTIK PADA IKAN DI SUNGAI BEDADUNG JEMBER JAWA TIMUR

Tubagus Sholihin

818-824

ANALISIS KEMAMPUAN MAKAN DAN MORTALITAS ULAT KANDANG (*Alphitobius diaperinus*) YANG TERPAPAR EKSTRAK DAUN LANTANA (*Lantana camara*)

Nurul Safitri, Priyantini Widyaningrum

792-801

ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN SEBAGAI UPAYA PENDUKUNG KEBERLANJUTAN EKOSISTEM DI WILAYAH KARESIDENAN MADIUN

Laili Zakiyyatus Sholihah, Rony Irawanto

899-906

BIOINDIKATOR KUALITAS AIR SUB-DAS KALI MADIUN

Adini Apriliani, Rony Irawanto

939-949

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PEMBANGUNAN KOTA DI MADIUN

Khumairoh Nur Abidah, Rony Irawanto

887-892

EKOSISTEM BINAAN

PERKEBUNAN SAWIT UNTUK PERLINDUNGAN HAYATI

Enda Kartika Sari, Krisdianto

812-817

IDENTIFIKASI JENIS LUMUT KERAK (Lichenes) DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG BANYAK KABUPATEN SRAGEN

Vakha Yulia Nurzahra, Muzazzinah, Meti Indrowati

846-850

IDENTIFIKASI MIKROBIOMA PADA SALURAN PERNAPASAN PASIEN COVID-19: TINJAUAN PENGEMBANGAN STRATEGI PENGOBATAN

Rina Isnawati, Ningsi

950-957

IDENTIFIKASI POLIMORFISME PADA DOMBA EKOR TIPIS BERDASARKAN TIPE KELAHIRANNYA MENGGUNAKAN ENZIM BFOI

Fauzia Sani, Ning Setiati

907-912

ISOLASI DAN KARAKTERISASI PEKTIN KULIT NANAS MADU (*Ananas comosus L*): TINJAUAN TINGKAT KEMATANGAN BUAH

Ruth Anastasya M Panjaitan, Hendrik Satria Dwi Putra, Agustina Setiawati

825-832

KANDUNGAN SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PADA *Octoblepharum albidum* DAN *Barbula javanica*

Dinda Syaputry, Sasi Gendro Sari, Rusmiati

930-938

KELIMPahan BURUNG BONDOL (GENUS: *Lonchura*) DI HABITAT PERSAWAHAN CILUBANG KOTA BOGOR

Sehabudin, Wahyu Widodo, Mia Azizah, Ade Ayu Okasari

964-971

LITERATURE REVIEW: AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK CABAI MERAH KERITING (*Capsicum annuum Longum*) TERHADAP *Staphylococcus aureus*

Mareta Indah Damayanti, Sri Utami

978-989

PEMBUATAN EKSTRAK KERING LESITIN BIJI BUNGA MATAHARI (*Helianthus annus*) MELALUI EKSTRAKSI ETANOL DAN AIR

Herlan Herdiawan, Rizki, Rizky Januardi, Bagas Kafabi Julianto, Diki Diki

840-845

PENERAPAN BIOTEKNOLOGI DALAM BUDIDAYA SPESIES IKAN PENTING SECARA KOMERSIAL

Aisyah, Yuniar Mulyani

990-995

PENGARUH EKSTRAK ETANOL DAUN MUDA SUNGKAI (*Peronema canescens Jack.*) TERHADAP VIABILITAS DAN KECEPATAN GERAK SPERMATOZOA MENCIT JANTAN (*Mus musculus*)

Siti Khotijah, Rusmiati

865-876

PERAN QUORUM SENSING TERHADAP INTERAKSI KOMUNITAS BAKTERI PADA PLAK GIGI

Muhamad Rivanha, Sri Utami

996-1008

PREDIKSI PENYEBARAN PENYAKIT EBOLA MENGGUNAKAN METODE KALMAN FILTER

Amaliyatul Hasanah

920-929

REVIEW ARTIKEL: KAJIAN POPULASI OWA JAWA (*Hylobates moloch*) DI PULAU JAWA, INDONESIA

Yulia Yasmin, Ade Ayu Oksari

958-963

STUDI HUBUNGAN KUANTITATIF STRUKTUR DAN AKTIVITAS PADA SENYAWA TURUNAN KUINON SEBAGAI ANTIKANKER

Risfiah Ruli Cahyani, Mokhamat Ariefin

893-898

STUDI POTENSI SENSOR KOLORIMETRI CEMARAN LOGAM PADA PERAIRAN GAMBUT MENGGUNAKAN NANOPARTIKEL PERAK

Eka Jhonatan Krissilvio, Rokiy Alfanaar

859-864

TINGKAT KEMATANGAN GONAD DAN INDEKS GONADOSOMATIK BEBERAPA JENIS IKAN LAUT DI PASAR CIROYOM, KECAMATAN ANDIR, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Maysandra Azka Ufhaira Telia Hadisaputra

833-839

1-25 of 27 **NEXT >****ISSN : 3047-6569 (Online)**

ISSN 3047-6569



9 773047 656004

Visitors

	4,914
	154
	12
	8
	6

656004

**...: Sub Tema :...****Matematika****Statistika****Sistem Informasi****Biologi****Agribisnis****Teknologi Pangan****Perencanaan Wilayah dan Kota****Manajemen Perikanan****Studi Lingkungan**Fakultas Sains dan TeknologiGedung Fakultas IUniversitas Terbuka

Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15437

Telp : (021) 7490941

e-Mail : fst@ecampus.ut.ac.id

ISOLASI DAN KARAKTERISASI PEKTIN KULIT NANAS MADU (*Ananas comosus L.*): TINJAUAN TINGKAT KEMATANGAN BUAH

Ruth Anastasya M Panjaitan, Hendrik Satria Dwi Putra, Agustina Setiawati*
Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Penulis korespondensi: nina@usd.ac.id

ABSTRAK

Pektin merupakan polimer heteropolisakarida dengan monomer yang bersifat mengikat air sehingga dapat diaplikasikan sebagai *gelling* dan *stabilizer agent* pada industri makanan dan minuman. Pektin banyak ditemukan pada buah-buahan yang umumnya diproduksi selama tahap awal pertumbuhan dinding sel primer, khususnya nanas (*Ananas Comosus L.*) Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan menentukan derajat esterifikasi pektin pada nanas tingkat kematangan nanas mentah dan nanas matang. Ekstraksi dilakukan dengan metode konvensional menggunakan asam sitrat. Kulit nanas (*Ananas Comosus L.*) mengandung $0,1895 \pm 0,084\%$; dan $0,1607 \pm 0,1166\%$ ($p < 0,05$) pada buah mentah dan matang. Berdasarkan hasil analisis *Fourier Transform Infrared* (FTIR), pektin yang dihasilkan mempunyai gugus fungsi identik dengan pektin komersial. Derajat esterifikasi pektin pada buah mentah adalah $52,25 \pm 0,94\%$ dan $46,61 \pm 0,79\%$ pada buah matang. Tingkat kematangan buah berpengaruh terhadap rendemen dan derajat esterifikasi pektin kulit buah nanas.

Kata kunci: buah nanas, pektin, derajat esterifikasi, ekstraksi, tingkat kematangan

1 PENDAHULUAN

Pektin, polimer D-galakturonat (GalpA) α -(1,4) yang dihubungkan oleh (1,2)-linked β -L-rhamnose, banyak ditemukan pada dinding sel tanaman dan mempunyai sifat biodegradable (Demir *et al.*, 2021; Einhorn-Stoll *et al.*, 2021). Dalam dunia industri makanan, pektin diaplikasikan sebagai agen pengental, penstabil, dan emulsifier. Selain itu, pektin juga dapat digunakan dalam sistem penghantaran obat dalam bidang kefarmasian (Lara-Espinoza *et al.*, 2018). Komposisi dan struktur pektin dipengaruhi oleh sumber pektin, perkembangan tanaman, dan kondisi ekstraksi (Picot-Allain *et al.*, 2022). Berdasarkan derajat esterifikasinya, pektin dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *High Methylated* (HM) Pektin dan *Low Methylated* (LM) pektin. HM pektin memiliki derajat esterifikasi $>50\%$ yang biasa didapatkan dari alam sebagai pektin asli, sedangkan LM pektin memiliki derajat esterifikasi $<50\%$ (Belkheiri *et al.*, 2021; Weimer *et al.*, 2021). Derajat esterifikasi merupakan salah satu sifat fisikokimia pektin yang penting yang mempengaruhi kemampuan gelling pektin sehingga berpengaruh terhadap aplikasinya dalam bidang industri makanan dan biomedis (Lara-Espinoza *et al.*, 2018; Mahmoud *et al.*, 2022).

Faktor yang dapat mempengaruhi kadar dan karakteristik pektin dalam tanaman adalah proses pematangan buah yang ditandai dengan perubahan fisiologis, biokimia, dan morfologi buah. Pada proses pematangan buah, dinding sel tanaman mengalami pelunakan yang disebabkan oleh aktivasi enzim poligalakturonases dan pektin metil esterase. Peristiwa tersebut juga menyebabkan depolimerisasi pektin, seperti yang terjadi pada alpukat dan tomat (Huber *et al.*,

2001; Paniagua *et al.*, 2014). Selain itu, enzim lain yang berperan untuk mendegradasi pektin terdeesterifikasi dalam proses pematangan buah adalah pektat liase (Wang *et al.*, 2018).

Kulit nanas (*Ananas comosus* L. Merr) merupakan salah satu sumber pektin dengan presentasi berkisar antara 1,0 -1,2% (Saputro *et al.*, 2018). Selain pektin, kulit buah nanas juga mengandung vitamin C, flavonoid, dan karotenoid (Jha *et al.*, 2021). Berat kulit nanas sekitar 10% dari total berat buah keseluruhan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rodsamran dan Sothornvit (2019) dengan menggunakan metode konvensional menunjukkan bahwa hasil rendemen yang diperoleh dari kulit nanas sangat rendah dengan hasil berkisar antara 1,02- 2,12 %. Ekstraksi pektin pada kulit nanas dengan air yang mengandung asam klorida diperoleh pektin sebanyak 5,25% (Zahrotun *et al.*, 2013), sedangkan ekstraksi menggunakan asam sulfat menghasilkan pektin sebanyak 13,78%. Ekstraksi menggunakan kedua asam kuat tersebut tidak disarankan asam kuat memiliki beberapa kerugian seperti dapat menimbulkan kerusakan pada instrumen yang digunakan dan tidak ramah terhadap lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran pada air. Selain dengan asam kuat, pektin dapat diekstraksi dengan asam organik seperti asam sitrat, asam laktat, dan lain sebagainya dengan kelebihan pektin yang diekstraksi memiliki viskositas dan derajat metilasi yang tinggi (Chandel *et al.*, 2022; Cho *et al.*, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pektin dari kulit nanas (*Ananas comosus* L. Merr) dan derajat esterifikasinya. Jenis nanas yang digunakan dalam penelitian ini adalah nanas madu. Ekstraksi dilakukan dengan asam sitrat dilanjutkan dengan presipitasi dalam pelarut etanol pada suhu 90°C. Pektin yang dihasilkan kemudian dianalisis gugus fungsinya dengan menggunakan *Fourier Transform Infrared* (FTIR), dibandingkan dengan komersial pektin.

2 METODE

2.1 Pembuatan simplisia kulit nanas (*Ananas comosus* L. Merr)

Buah nanas yang digunakan adalah nanas madu yang didapatkan dari Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum digunakan, nanas telah dideterminasi secara taksonomi dengan nomor 02/LKTO/Far-USD/VI/2024. Buah nanas kemudian disortir dari buah yang busuk atau rusak, selanjutnya dilakukan pengelompokan tingkat kematangan antara buah nanas matang dan buah nanas mentah. Buah nanas dibersihkan dengan menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel. Kulit nanas dipisahkan dari buahnya dengan cara dikupas, kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven yang sudah diberikan kertas saring dengan suhu 50°C. Kulit nanas kemudian dihaluskan dengan cara diblender dan diayak dengan ayakan ukuran 100 mesh.

2.2 Ekstraksi Pektin

Sebanyak 10-gram serbuk kulit nanas yang telah dihasilkan dimasukkan ke dalam erlenmeyer lalu ditambahkan dengan larutan 0.1% asam sitrat sebanyak 300 mL, kemudian dipanaskan dalam *waterbath* pada suhu 65°C selama 90 menit. Selanjutnya, larutan disaring dengan menggunakan microfilter nylon ukuran mesh 100. Filtrat pektin ditambahkan etanol dengan perbandingan volume 1:1 ke dalam erlenmeyer dan diaduk hingga homogen. Pektin kemudian dibiarkan mengendap selama 24 jam, kemudian disaring menggunakan microfilter nylon ukuran 400 mesh. Pektin basah yang dihasilkan kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 50°C. Rendemen pektin dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rendemen (\%)} = \frac{\text{Berat Pektin kering (g)}}{\text{Berat serbuk simplisia (g)}} \times 100\%$$

2.3 Karakterisasi Pektin

2.3.1 Penentuan Derajat Esterifikasi

Penentuan derajat esterifikasi pektin dari kulit buah jeruk nipis dilakukan dengan menggunakan metode titrimetri pada USP 43 NF 38 (2020). Pektin sebanyak 0,1 gram diberi etanol sebanyak 1 mL dan dilarutkan dalam 20 mL air bebas CO₂ pada erlenmeyer. Pelarutan pektin dilakukan dengan pengadukan pektin menggunakan magnetic stirrer pada suhu 40°C secara terus menerus sampai pektin larut dengan sempurna. NaCl sebanyak 0,2 gram ditambahkan ke erlenmeyer. Indikator fenolftalein ditambahkan ditambahkan sebanyak 5 tetes pada erlenmeyer. Proses titrasi dilakukan menggunakan NaOH 0,1 N sebagai titran dan dititrasi hingga terdapat perubahan warna larutan pada erlenmeyer menjadi merah muda yang tidak hilang setelah dilakukan pengocokan. Jumlah volume titran yang digunakan kemudian dicatat sebagai V₁ (mL). NaOH 0,25 N ditambahkan sebanyak 5 mL kemudian larutan diaduk secara terus menerus dalam erlenmeyer tertutup selama 30 menit pada suhu ruang menggunakan magnetic stirrer. HCl 0,25 M ditambahkan sebanyak 5 mL pada erlenmeyer hingga larutan menjadi jernih. Titrasi dilakukan kembali menggunakan NaOH 0,1 N sampai mendapatkan warna merah muda pucat. Jumlah titran yang digunakan dicatat sebagai V₂. Nilai derajat esterifikasi (DE) ditentukan dengan rumus:

$$DE = \frac{V_2}{V_1 + V_2} \times 100\%$$


2.3.2 Analisis Gugus Fungsi

Analisis gugus fungsi pada pektin dilakukan dengan instrumen FTIR. Peak yang dihasilkan oleh pektin yang diekstraksi dari kulit nanas dibandingkan dengan peak dari pektin standar menggunakan instrumen 20 FTIR. Pengukuran dilakukan dengan interval penyerapan 2 cm⁻¹ dengan rentang panjang gelombang 4000-400 cm⁻¹.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Isolasi Pektin Kulit Nanas Mentah dan Matang

Pada penelitian ini, kami melakukan isolasi pektin dari kulit nanas madu (*Ananas comosus* L) yang telah diteliti sebelumnya sebagai sumber potensial pektin (Saputro *et al.*, 2018; Sarangi *et al.*, 2020; Zakaria *et al.*, 2023). Pektin kulit buah nanas diekstraksi menggunakan prosedur dalam **Gambar 1**. Penelitian ini mengadopsi prinsip ekstraksi hijau dengan menggunakan asam sitrat, dengan menghindari asam mineral seperti HCl, H₂SO₄, atau HNO₃ yang bersifat korosif bagi lingkungan dan meninggalkan residu beracun pada pektin (He *et al.*, 2021). Pektin terlarut dalam larutan asam bersama dengan penyusun dinding sel yang lain (seperti protopectin), sehingga meningkatkan pektin yang terekstraksi (Grave *et al.*, 1994). Pektin diekstraksi dengan melakukan pemanasan serbuk kulit nanas mentah dan matang dalam larutan asam sitrat 0,1% pada suhu 65°C. Pektin yang terlarut kemudian dipisahkan dengan residu dengan filtrasi, kemudian pektin diendapkan menggunakan etanol. Dalam proses pengendapan ini, pektin dipisahkan dari pengotornya berupa senyawa-senyawa polar yang berwarna seperti antosianin, betacyanin, pigmen merah dan senyawa fenolik (Khoo *et al.*, 2022; Shofinita *et al.*, 2020). Prosedur pengendapan etanol ini dapat dilakukan secara berulang untuk mendapatkan pektin bebas pengotor.



Gambar 1. Skema isolasi pektin kulit nanas (*Ananas comosus* L.). Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut 0,1% asam sitrat dalam air dilanjutkan dengan metode presipitasi etanol. Ilustrasi dibuat dengan Biorender.


Kulit nanas yang digunakan adalah kulit buah mentah dan matang, yang ditandai dengan warna hijau untuk kulit nanas mentah dan warna kuning untuk kulit nanas matang (**Gambar 2a**). Pada penelitian sebelumnya, pektin yang diekstraksi menggunakan H_2SO_4 dari *by product* nanas sebesar 13.812% (Karim *et al.*, 2014) dan dari kulit nanas sebesar 11.42% (Sarangi *et al.*, 2020). Kedua penelitian tersebut tidak diketahui tingkat kematangan nanas yang digunakan. Pektin yang berhasil diekstraksi pada kulit nanas mentah sebanyak $1.81 \pm 0.00\%$, lebih tinggi dibandingkan pektin pada kulit nanas matang $1.55 \pm 0.00\%$ ($p < 0.05$) (**Gambar 2b**). Proses pematangan buah mengaktivasi enzim poligalakturonases dan pektin metil esterase buah yang menyebabkan dinding sel tanaman mengalami pelunakan. Peristiwa tersebut juga menyebabkan depolimerisasi pektin (Huber *et al.*, 2001; Paniagua *et al.*, 2014), yang menyebabkan pektin pada kulit buah matang lebih rendah dibandingkan buah mentah. Selain itu, pektin yang dihasilkan baik dari kulit nanas mentah dan matang berwarna gelap (**Gambar 2c**), dibandingkan pada penelitian Setyajati *et al* (2023). Kemungkinan penggelapan warna pektin ini disebabkan karena oksidasi pektin, atau senyawa fenolik yang terekstraksi bersama pektin.



Gambar 2. Ekstraksi pektin kulit buah nanas pada tingkat kematangan berbeda; (a) Buah dan kulit buah nanas mentah dan matang, (b) Rendemen pektin kulit nanas mentah dan matang, (c) Serbuk pektin kulit nanas mentah dan matang.

3.2 Karakterisasi Pektin Kulit Nanas

3.2.1 Analisis Gugus Fungsi Pektin Kulit Nanas




Gambar 3. Spektra FTIR Pektin Kulit Nanas mentah dan Matang

Spektra FTIR dari pektin yang diekstraksi dari kulit nanas mentah dan matang mirip dengan pektin komersial. Karakteristik peak pada pektin yang diekstraksi dari nanas muncul pada panjang gelombang 3323, 2917, 1727, dan 1630 cm^{-1} . Serapan 3323 cm^{-1} merupakan gugus hidroksil (O-H) dan C-H stretching. Serapan 1737 cm^{-1} dikaitkan dengan adanya gugus karbonil (C=O) dari metil ester (COOCH₃) dan asam karboksilat yang tidak terdisosiasi (COOH). Kemudian pada 1630 cm^{-1} terdapat gugus ion karboksilat (COO⁻) yang disebabkan oleh vibrasi regangan asimetris. Selain itu, terdapat serapan pada $1200\text{-}950 \text{ cm}^{-1}$ berupa fingerprint karbohidrat yang merupakan wilayah spesifik untuk setiap polisakarida (Demir *et al.*, 2021; Mahmoud *et al.*, 2022; Setyajati *et al.*, 2023; Silverstein *et al.*, 2005 2023). Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika gugus fungsi pektin yang diekstraksi dari kulit buah nanas identik dengan gugus fungsi pektin standar (**Gambar 3, Tabel 1**).

Tabel 1. Spektra gugus fungsional pektin kulit nanas mentah dan matang, serta komersial
Puncak spektra (cm^{-1}) Pektin

Gugus fungsional	Kulit nanas mentah	Kulit nanas matang	Pektin komersial (Setyajati <i>et al.</i> , 2023)
O-H stretching	3323	3323	3320
C-H	2917	2917	2925
C=O stretching	1727	1727	1733
COO	1630	1630	1460-1414
C-O fingerprint	1151,1031	1151,1031	1200-950

3.2.2 Derajat Esterifikasi Pektin Kulit Nanas



Gambar 4. Derajat Esterifikasi Pektin Kulit Nanas

Pektin yang diekstraksi dapat digolongkan sebagai *High-methoxyl* (HM) pektin dengan DE >50% pada kulit nanas mentah, sedangkan pada kulit nanas matang termasuk *Low-methoxyl* (LM) pektin dengan DE < 50%. DE pektin pada kulit nanas mentah sebesar 51.76 ± 0.94 , sedangkan pada kulit nanas matang sebesar 47.52 ± 0.79 ($p<0.05$) (Gambar 4). DE pada kulit buah matang lebih rendah disebabkan karena aktivasi enzim pektin liase yang mendegradasi pektin terdeesterifikasi pada dinding sel selama proses pematangan buah (Wang *et al.* 2018). Perbedaan DE dapat menyebabkan perbedaan karakteristik pektin kulit buah mentah dan matang. Pektin dengan DE tinggi larut dan membentuk gel dalam pelarut asam dengan pH 3,5, sedangkan pektin dengan DE rendah larut dalam larutan yang mengandung kation divalent, seperti Ca^{2+} (Chandel *et al.*, 2022). Pembentukan gel ini penting untuk mengaplikasian pektin.

4 KESIMPULAN

Pektin yang diekstraksi dari kulit nanas madu (*Ananas comosus* L) mentah lebih tinggi dibandingkan kulit nanas matang. Pektin pada kulit buah nanas mentah mempunyai derajat esterifikasi yang tinggi dibandingkan dengan kulit buah matang. Pektin baik dari kulit buah dan matang menunjukkan gugus fungsi yang identik dibandingkan pektin komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkheiri, A., Forouhar, A., Ursu, A.V., Dubessay, P., Pierre, G., Delattre, C., Djelveh, G., Abdelkafi, S., Hamdami, N., Michaud, P., (2021). Extraction, Characterization, and Applications of Pectins from Plant By Products. *Applied Sciences Journal*, 11(14), 1–2. <https://doi.org/10.3390/app11146596>.
- Chandel V, Biswas D. Roy S., Vaidya S., Verma A, Gupta A. (2022). Current Advancements in Pectin: Extraction, Properties and Multifunctional Applications. *Foods*, 11(17), 2683. <https://doi.org/10.3390/foods11172683>.
- Cho, E.H., Jung, H.T., Lee, B.H., Kim, H.S., Rhee, J.K., Yoo, S.H., (2019). Green process development for apple-peel pectin production by organic acid extraction. *Carbohydrate Polymers*, 204, 97–103. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.09.086>.
- Demir, D., Ceylan, S., Göktürk, D., Bölgön, N., (2021). Extraction of pectin from albedo of lemon peels for preparation of tissue engineering scaffolds. *Polymer Bulletin*, 78(4), 2211–2226. <https://doi.org/10.1007/s00289-020-03208-1>.

- Einhorn-Stoll, U., Archut, A., Eichhorn, M., Kastner, H., (2021). Pectin - Plant protein systems and their application. *Food Hydrocolloids*, 118, 106783. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.106783>.
- Jha, A. K., Singh, P.T., Assumi, S. R. (2021). *Nanas (Ananas comosus L. Merr.)*. Tanaman Buah Tropis: Teori hingga Praktis. Pp 487-488.
- He C, Sampers I, Raes K. (2021). Isolation of pectin from clementine peel: A new approach based on green extracting agents of citric acid/sodium citrate solutions. *ACS Sustain Chem Eng*, 9(2), 833–843. <https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c07422>.
- Huber D.J., Karakurt Y., Jeong J. (2001). Pectin degradation in Ripening and Wounded Fruit. *R.Bras.Fisiol.Veg.* 13(2), 224-241. <https://doi.org/10.1590/S0103-31312001000200009>.
- Khoo HE, He X, Tang Y, Li Z, Li C, Zeng Y, Tang J, Sun J. (2022). Betacyanins and anthocyanins in pulp and peel of red pitaya (*Hylocereus polyrhizus* cv. Jindu), inhibition of oxidative stress, lipid reducing, and cytotoxic effects. *Front Nutr*, 9, 894438. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.894438>.
- Lara-Espinoza, C., Carvajal-Millán, E., Balandrán-Quintana, R., López-Franco, Y., Rascón-Chu, A., 2018. Pectin and pectin-based composite materials: Beyond food texture. *Molecules*, 23(4). <https://doi.org/10.3390/molecules23040942>.
- Mahmoud, M.H., Abu-Salem, F.M., Azab, D.E.S.H., (2022). A Comparative Study of Pectin Green Extraction Methods from Apple Waste: Characterization and Functional Properties. *International Journal of Food Science*, 865921. <https://doi.org/10.1155/2022/2865921>.
- Paniagua C., Pose S, Morris V.J., Kirby A.R., Quesada M.A., Mercado J.A., (2014). Fruit Softening and Pectin dissassembly: an Overview of Nanostructural pectin modifications assessed by atomic force microscopy. *Annals of Botany*, 114, 1375-1383. <https://doi.org/10.1093/aob/mcu149>.
- Picot-Allain, M.C.N., Ramasawmy, B., Emmambux, M.N., 2022. Extraction, Characterisation, and Application of Pectin from Tropical and Sub-Tropical Fruits: A Review. *Food Reviews International*, 38(3), 282–312. <https://doi.org/10.1080/87559129.2020.1733008>.
- Rodsamran P., Sothornvit R. (2019). Microwave heating extraction of pectin from lime peel: Characterization and properties compared with the conventional heating method. *Food Chem*, 25, 278, 364-372. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.11.067>.
- Saputro, T. A., Permana, I. D. G. M., Yusasrini, N. L. A., 2018. Pengaruh Perbandingan Nanas (*Ananas comosus* L. Merr) dan Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.) terhadap Karakteristik Selai. *Jurnal ITEPA*, 7 (1), 52-60.
- Setyajati, F.E., Prasetyo, V.K., Husin, A.S., Ratri, M.C., Junedi, S., Sanjayadi, S., Setiawati, A., (2023). Comparative Physicochemical Properties of Isolated Pectin from Various Tropical Fruit. *Tropical Journal of Natural Product Research*, 7(2), 2408–2413. <http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i2.17>.
- Sarangi, P. K., Singh, N. J., & Singh, T. A. (2020). Pectin from Pineapple Wastes: Isolation and Process Optimization. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci*, 9(5), 143–148. <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2020.905.01>.
- Shofinita D, Bindar Y, Samadhi TW, Jaelawijaya AA, Fawwaz M. (2020). Effect of ethanol addition as extraction solvent on the content of bioactive materials in dragon fruit skin extract and powder. *Reaktor.*; 20(2):68–74. <https://doi.org/10.14710/reaktor.20.2.68-74>.
- Silverstein, R.M., Webster, F.X., Kiemle, D.J., (2005). *Spectrometric Identification of Organic Compounds (seventh edition)*. Analytical Chemistry. New York.

- U.S. Pharmacopeia (2020). The United States Pharmacopeia, USP 43-National Formulary, NF 38. Rockville, MD: U.S. Pharmacopeial Convention, Inc., p:736.
- Wang D., Yeats T.H., Uluisik S., Rose J.K.C., Seymour G.B. (2018). Fruit Softening: Revisiting the Role of Pectin. *Trend in Plant Science*. 23(4), 302-310. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.01.006>.
- Weimer, P., Lisbôa Moura, J.G., Mossmann, V., Immig, M.L., de Castilhos, J., Rossi, R.C. (2021). *Citrus aurantiifolia* (Christm) Swingle: Biological potential and safety profile of essential oils from leaves and fruit peels. *Food Bioscience*, 40. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2021.100905>.
- Zahrotun, N. E., Nugraheni, Y., Rusdiansjah (2013). Pengaruh Suhu dan Waktu Terhadap Hasil Ekstraksi Pektin dari Kulit Buah Nanas. *Simposium Nasional RAPI XII*, 39-43.
- Zakaria N.A., Rahman R.A., Zaidel D.N.A, Dailin D.J., Jusoh M. (2021). Microwave-assisted extraction of pectin from pineapple peel. *Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences*. 17(1), 33-38. <https://doi.org/10.11113/mjfas.v17n1.2164>.